

Malariaprophylaxe für Erwachsene mit Tabletten

Tabletteneinnahme nach dem Essen, am besten abends.

Atovaquon/Proguanil

Beginn:
1 - 2 Tage vor Abreise
Ende:
7 Tage nach Rückkehr

täglich 1 Tablette

Doxycyclin - Monohydrat 100 mg

Beginn:
1 Tag vor Abreise
Ende:
4 Wochen nach Rückkehr

täglich 1 Tablette

Doxycyclin wird von der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft und der Weltgesundheitsorganisation zur Malariaprophylaxe empfohlen, auch wenn es in Deutschland für diese Indikation nicht zugelassen ist.

Es gibt keine homöopathische Malariaprophylaxe!

Empfehlungen zur Prophylaxe und Therapie der Malaria und Länderinformationen der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit (DTG):
<https://www.dtg.org/empfehlungen-und-leitlinien/empfehlungen/malaria.html>

Schutz vor Mückenstichen, besonders bei Dämmerung und in der Nacht

- Einreiben unbedeckter Hautstellen mit moskitoabweisenden Mitteln (Repellentien), Inhaltsstoffe: Icaridin ab 20 %/ Deet ab 30 %
- Tragen von hautbedeckender Kleidung
- Aufenthalt in mückensicheren Räumen (Klimaanlage, Fliegengitter)
- Anwendung von Moskitonetzen, am besten imprägniert.

Lesen Sie sorgfältig die Beipackzettel der Medikamente.

Bei jeder fieberhaften Erkrankung muss auch längere Zeit nach der Rückkehr aus einem Malariagebiet an Malaria gedacht werden, der behandelnde Arzt muss von Ihnen auf Ihren Tropenaufenthalt hingewiesen werden.

Verschenken Sie bitte keine Malariatabletten an Einheimische, unsachgemäße Einnahme kann die Resistenzbildung fördern.

Ausführliche Informationen zur Malaria finden Sie auch auf den Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit unter www.dtg.org

Impf- und Beratungsstelle für Reisemedizin

Horner Str. 60-70 | 28203 Bremen

☎ +49 421 361 8585