


















Übersicht der gängigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Kitas und Schulen (gemäß § 34 in Verbindung mit § 33 Infektionsschutzgesetz - IfSG)

Erläuterung:  bedeutet: umgehende Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt
 bedeutet: Impfung ist möglich und von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen

ERKRANKUNG	a) Inkubationszeit b) Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung nach Erkrankung ¹	Meldepflicht ²	Impfung v. STIKO empfohlen?
Brechdurchfall-erkrankungen, auch ohne Erregernachweis	a) 6-50 Stunden b) 1-3 Tage	48 h nach Ende der Symptomatik	Ja , • bei Kindern unter 6 • bei mehr als 2 gleichzeitigen Erkrankungen • auch Verdachtsfälle	Entfällt
Rotaviren	a) 1-3 Tage	48 h nach Ende der Symptomatik	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja 
Masern	a) 7-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Mumps	a) 16-18 Tage (möglich auch 12-25 Tage) b) Bis zu 9 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Nach Genesung, frühestens 9 Tage nach Schwellung der Drüsen	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Röteln	a) 14-21 Tage b) Bis zum Beginn des Ausschlags	Nach Ende der Symptomatik	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Windpocken	a) 14-21 Tage b) Bis zum Beginn des Ausschlags	Eine Woche nach Krankheitsbeginn möglich (Abheilen der Pocken)	Ja , auch Verdachtsfälle	Ja 
Hepatitis A	a) 15-50 Tage; gewöhnlich 25-30 Tage b) 1-2 Wochen vor und bis zu 1 Woche nach Auftreten des Ikterus (Gelbsucht)	2 Wochen nach Auftreten der ersten klinischen Symptome bzw. eine Woche nach Auftreten des Ikterus (Gelbsucht) möglich.	Ja , auch Verdachtsfälle	Ja 
Hepatitis E	a) 15-64 Tage	Nicht abschließend geklärt > Kontakt mit Gesundheitsamt aufnehmen	Ja , auch Verdachtsfälle	Nein

¹ Wiederzulassungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI): https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung_Tabelle.pdf?__blob=publicationFile&v=5

² Eine *Benachrichtigungspflicht* gegenüber dem Gesundheitsamt besteht grundsätzlich bei allen Infektionskrankheiten und Erkrankungen mit schwerem Verlauf (zum Beispiel Krankenhausaufenthalt) oder einer außergewöhnlichen Häufung gleichartiger Infektionen in der Einrichtung.

ERKRANKUNG	a) Inkubationszeit b) Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung nach Erkrankung ¹	Meldepflicht ²	Impfung v. STIKO empfohlen?
Keuchhusten	a) 9-10 Tage (6-20 Tage möglich) b) Ohne Behandlung bis zu 3 Wochen, mit Antibiotika 3-7 Tage	5 Tage nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst 3 Wochen nach Beginn des Hustens	Ja , auch Verdachtsfälle	Ja 
Meningokokken-Erkrankung	a) 3-4 Tage (2-10 Tage möglich) b) Bis 24 h bei erfolgreicher Antibiotika-Therapie	Nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie und Genesung	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja 
Haemophilus influenzae (Hib-Meningitis)	a) 2-10 Tage b) Bis 24 h bei erfolgreicher Antibiotika-Therapie	Nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie und Genesung	Ja , auch Verdachtsfälle 	Ja 
Scharlach	a) 1-3 Tage, selten länger b) 24 h nach Beginn einer Antibiotika-Therapie	24 h nach Beginn der Antibiotika-Therapie, sonst nach Genesung	Ja , auch Verdachtsfälle	Nein
Ansteckende Borkenflechte	a) 1-3 Tage, selten länger b) 24 h nach Beginn einer Antibiotika-Therapie	24 h nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst nach Abheilung der betroffenen Stellen	Ja , auch Verdachtsfälle	Nein
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	a) 3-10 Tage (auch 1-30 Tage möglich) b) schon vor Auftreten der Bläschen	Nach Genesung	Nein	Nein
Ringelröteln	a) 7-18 Tage b) bis zum Beginn des Ausschlags	Nach Genesung	Nein	Nein
Ansteckende Bindehautentzündung (Adenoviren)	a) 5-12 Tage b) 14 Tage	Wiederzulassung nur mit ärztlichem Attest möglich	Ja , ab 2 Fällen	Nein
Eitrige (bakterielle) Bindehautentzündung	a) Entfällt b) 5-12 Tage je nach Erreger	Nach Genesung bzw. 24 h nach Beginn der Antibiotikagabe	Nein	Nein
Krätze (Skabies)	a) 4-6 Wochen b) Die Ansteckungsfähigkeit bleibt erhalten, solange Milben in der Haut nachzuweisen sind	Nach erfolgter Behandlung nach Plan	Ja , auch Verdachtsfälle	Nein
Kopfläuse	a) Entfällt b) Die Ansteckungsfähigkeit bleibt erhalten, solange noch Läuse sichtbar sind und nicht adäquat behandelt wurde	Nach erfolgter Behandlung nach Plan	Ja	Nein